

ALBENZOL®
ALBENDAZOL 200mg

**TABLETA
MASTICABLE**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE:

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

FÓRMULA DE COMPOSICIÓN:

Cada Tableta Masticable contiene:

Albendazol 200mg

EXCIPIENTES: Lactosa de flujo rápido, almidón para pasta, estearato de magnesio, aerosil 200, sacarina sódica, aroma tutifrutí, agua desionizada, acdisol.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:

Antiparasitario (Anthelmíntico).

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vía de administración: Oral.

Dosificación:

En áscaris lumbricoides, enterobius vermicularis necátor americano, Ancylostoma duodenalis y trichura, adultos y niños mayores de dos años masticar 400mg (dos tabletas de 200 mg o un frasco suspensión de 20ml en una sola toma). Niños entre uno y dos años la mitad de la dosis.

Strongyloides, teniasis e hymenolepiasis, adultos y niños desde los dos años de edad, masticar 400 mg o un frasco completo de suspensión 20 ml en una sola toma por tres días seguidos.

Clonorchiasis, opisthorchiasis adultos y niños desde los dos años de edad: Masticar 400 mg o un frasco completo (20 ml) de suspensión dos veces por día por tres días consecutivos.

En el quiste hidatídico 400 mg cada 12 horas con las comidas por 28 días.

En caso de recidivas después de tres semanas iniciar un nuevo tratamiento.

Para lograr una mejor o completa curación, en la infestación por Enterovirus vermiculares se debe tratar simultáneamente, a todas las personas que habitan en un mismo hogar.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Helminthiasis (parasitosis) simple o mixta. Nemátodos Áscaris lumbricoides, Oxiuros. Ancylostoma trichuris trichuras, Strongyloides stercoralis, Cestones Taenia spp e Hymenolepis nana solo en casos de parasitismo asociado. Clonorchis sinensis, Opisthorchiasis, larva migratoria cutánea, Giardiasis en niños (Giardia Lamblia) Quiste hidatídico.

ADVERTENCIAS:

En mujeres en edad fértil deberá administrarse dentro del lapso de los siete días después del primer día de la menstruación; además se tomará medidas anticonceptivas durante un mes después de terminar el tratamiento con Albenzol en el Quiste Hidatídico.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes del fármaco. 'No usar en periodos de lactancia o de gestación o en mujeres en que se sospeche embarazo. No administrar a niños menores a un año. En niños de uno a dos años se recomienda la mitad de la dosis.

EFFECTOS INDESEABLES:

Se han comunicado raros casos de malestares gastrointestinales: dolor abdominal, nauseas, mareos y cefalea.

SOBREDOSIS:

Síntomas: Náuseas, vómitos, cefalea
Tratamiento: Sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

ALBENZOL® Reg. San.: 7.323-2-04-04
CAJA x 10 RISTRAS DE 2 TABLETAS
CAJA x 25 RISTRAS DE 2 TABLETAS
CAJA x 1 BLISTER x 10 TABLETAS C/U
CAJA x 2 BLISTER x 10 TABLETAS C/U
CAJA x 3 BLISTER x 10 TABLETAS C/U
CAJA x 4 BLISTER x 10 TABLETAS C/U
CAJA x 5 BLISTER x 10 TABLETAS C/U
CAJA x 1 BLISTER x 2 TABLETAS

Elaborado por
Laboratorios Dr. A. Bjarner C.A.

Guayaquil - Ecuador

Calicuchima 601 y Noguchi / Casilla 01-09-1292

Email: info@grupoecu.com

www.laboratoriosbjarnar.com



FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

FÓRMULA DE COMPOSICIÓN:

Cada 20 ml = 1 frasco contiene: Albendazol 400,00 mg

Excipientes:

Carboximetil Celulosa, Sacarina Sódica, Ácido cítrico, Propil Paraben, Metil Paraben, Sorbitol, Esencia de Piña, Esencia de Albaricoque, Esencia de Vainilla, Alcohol, Agua Deionizada.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:

Antiparasitario (Antihelmíntico).

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION:

VIA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL

DOSIFICACIÓN:

Dosis para niños de 2 a 12 años:

Para tratar: *Ascaris lumbricoides*, *enterobius vermicularis*, *necator americano*, *ancylostoma duodenalis* y *trichuris trichura*, mayores de 2 años un frasco 20 ml (400 mg) de Albenzol. Niños de 1 a 2 años la mitad del frasco. En caso de *Strongyloides vermiculares*, *Taenias* e *Hymenolepis Nana*, niños de 2 años de edad, 1 frasco de 20 ml por 3 días consecutivos. Quiste hidatídico en niños mayores de 6 años, 1 frasco cada 12 horas con las comidas por 28 días.

INDICACIÓN TERAPÉUTICA:

Helminthiasis (Parasitosis), *Nemátodos (Ascaris lumbricoides)*, *Oxiuros*, *Ancylostomas Trichuris trichuras*, *Strongyloides stercoralis*.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes del fármaco.

No usar en periodos de lactancia o de gestación, o en mujeres en que se sospeche embarazo.

PRECAUCIÓN:

No se recomienda el tratamiento para el quiste hidatídico en niños menores de 6 años. En las mujeres, en la edad fértil, el Albenzol deberá administrarse dentro del lapso de los 7 días después del inicio de la menstruación. Además, se deberá hacer prevenciones anticonceptivas durante y hasta después de un mes de terminar el tratamiento con Albenzol en el quiste hidatídico.

EFFECTOS INDESEABLES:

Se han comunicado raros casos de malestares gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas, mareos y cefalea.

SOBREDOSIS:

Síntomas: Náuseas, vómitos, cefaleas. Tratamiento: Es sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura no mayor a 30° C. Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

ALBENZOL 1 caja frasco x 20 ml + cucharita dosificadora. - Reg. San. 7.324-2-10-03