

Bioflavon® K Jarabe

**ÁCIDO ASCORBICO (UIT. C), MENADIONA SODIO
BISULFITO (UIT. H₃), HESPERIDINA METIL CHALCONA**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

Bioflavon® K Jarabe

Fragilidad Capilar Aumentada

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene: Ácido Ascórbico (Vit. C) 2 g, Hesperidina Metil Chalcona 1,250 g, Menadiona Sodio Bisulfito (Vit. K₃) 0,0130 g.

EXCIPIENTES: Sorbitol, Metilparabeno, Propilparabeno, Sacarosa, Edetato Disódico, Color Verde #3 FDC CI 42053, Etanol y Agua Purificada.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:

Bioflavonoides, Agentes Estabilizadores de Capilares.

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION:

VIA DE ADMINISTRACIÓN: Oral.

INDICACIONES: Bioflavon® K Jarabe para fragilidad capilar aumentada en tratamiento de insuficiencia venosa crónica, dermatitis varicosa, úlcera varicosa, linfedema, hemorroides o coadyuvante en la terapia de otras enfermedades anales, varicoflebitis y trastornos retinianos vasculares.

DOSES: Bioflavon® K Jarabe, Adultos: 5 a 15 mL tres veces al día.

Niños: 5 a 10 mL tres veces al día.

En hemorroides o procesos trombofibróticos se suele dar por 30 días a 100 mg/kg/día, vía oral

ADVERTENCIAS: Puede provocar diarrea lo que desaparece al interrumpir el tratamiento.

REACCIONES ADVERSAS: Diarrea que si se mantiene el tratamiento, puede desencadenar desbalance de electrolitos y hasta pérdida de peso. Nauseas o gastralgias. Otras de tipo dermatológico como eritema, prurito y urticaria.

CONTRAINDICACIONES: Cualquiera de sus componentes puede producir Hipersensibilidad o reacciones alérgicas como cefaleas, rubores; estos desaparecen al discontinuar el tratamiento.

PRECAUCIONES GENERALES: Si se presentaran nauseas o gastralgias, se debe tomar antes de las comidas. En caso de presentar diarrea consulte con su médico.

En caso de que los síntomas persistan por más de 15 días, consulte con su médico.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: Tener en cuenta riesgo de hepatotoxicidad o anemia hemolítica

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: No hay estudios al respecto.

EMBARAZO Y LACTANCIA: No existen estudios adecuados en humanos para determinar su uso, sin embargo un médico lo puede recomendar evaluando el riesgo/beneficio. Igualmente en lactancia, será mejor evitar el uso de Bioflavon® K Jarabe.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONducIR: Ninguna descrita al momento.

SOBREDOSIS: No se tienen hasta el momento casos reportados de sobredosis.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Todo medicamento debe conservarse a temperatura no mayor a 30° C y fuera del alcance de los niños.

VENTA LIBRE

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Bioflavon® K Jarabe

Caja Frasco x 118ml + inserto

Caja Frasco x 30 ml + inserto (Muestra Médica)

Reg. San. 02263-MAC-11-02