

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA: Laxante por contacto.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Rectal.

COMPOSICIÓN:

Anulax ® ADULTOS cada supositorio contiene Bisacodil 10 mg. Excipientes: Subanal IM-9, Myrtil 318

Anulax ® INFANTIL cada supositorio contiene Bisacodil 5 mg. Excipientes: Subanal IM-9, Myrtil 318

INDICACIONES:

Anulax ® es un laxante por contacto cuya actividad se manifiesta únicamente sobre la mucosa del intestino grueso, aumentando el peristaltismo sin ocasionar irritación. El efecto laxante de Anulax ® supositorios se realiza después de media hora de la aplicación.

Anulax ® Indicado en el estreñimiento crónico o atónico simple; por cambio de dieta o de ambiente. En estados cardiocirculatorios o metabólicos. En el preoperatorio. En el parto. En la preparación para estudios radiológicos abdominales; recto sigmoidoscopias y colonoscopias. En hemorroides y fisuras anales. Antes de los exámenes coprológicos para facilitar la toma de las muestras.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al bisacodilo. Enfermedades abdominales agudas: apendicitis, obstrucción intestinal, vómito, deshidratación intensa. Embarazo, lactancia.

REACCIONES ADVERSAS:

En el transcurso, después de la administración, pueden ocurrir disturbios abdominales como dolores, calambres, diarreas.

PRECAUCIONES:

El bisacodil en general es un producto que se debe usar por corto tiempo, de tres a cinco días, ya que puede propender producir un intestino que requiera del uso frecuente de cualquier tipo de laxante. Y tener que usarlo continuamente.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Debido a que incrementa el peristaltismo del colon, no es recomendable el uso concomitante de ningún medicamento y de los supositorios de bisacodil. Tampoco el uso de hidróxido de aluminio y magnesio previo la colocación de los supositorios ya que impiden la acción del bisacodil.

DOSIFICACIÓN:

Supositorios adultos: 1 supositorio (10 mg), 15 o 30 minutos antes de la evacuación deseada.

Para la preparación de radiografías abdominales y de intervenciones quirúrgicas, se recomienda un supositorio por la mañana, a fin de lograr una evacuación completa de todo el tracto gastrointestinal.

Supositorios para niños desde 4 años: 1 supositorio (5 mg) antes de la evacuación deseada.

SOBREDOSIS:

En caso de ingesta accidental de los supositorios induzca al vómito y dele tratamiento sintomático de soporte, y lleve al paciente a un Centro de Salud.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase original a temperatura no mayor a los 30° C y protegido de la luz.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Anulax ® Adultos

Caja por 1 ristra de 5 supositorios Reg. San. 3.370-4—01- 04

Anulax ® niños

Caja por 1 ristra de 5 supositorios Reg. San. 3.397-4- 10-03