

ALBENSEC®

PACK ANTIPARASITARIO DE USO PEDIATRICO UÍA ORAL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

Albenzol: Albendazol 100 mg / 5 ml Suspensión
Ecuzol 500: Secnidazol 500 mg Polvo para Suspensión Oral

FÓRMULA DE COMPOSICIÓN:

ALBENZOL

Cada 20 ml= 1 frasco contiene:

Albendazol 400,00 mg

Excipientes: Carboximetil Celulosa, Sacarina Sódica, Acido Cítrico, Propil Paraben, Metil Paraben, Sorbitol, Esencia de Piña, Esencia de Albaricoque, Esencia de Vainilla, Alcohol, Agua Deionizada.

ECUZOL – 500

Cada 9,2 g de polvo para reconstituir 15 ml de suspensión oral contiene:

Secnidazol 500,00 mg

Excipientes: Polisacárido Galactomanano, Sacarosa, Esencia de naranja, Sucralosa, Sacarina Sódica, Acido Cítrico, Metil Parabeno, Propil Parabeno, Dióxido de Silicio Coloidal.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Albenzol (Albendazol) es un potente antihelmíntico que actúa frente a parásitos intestinales y tisulares en todas sus fases.

Ecuzol (Secnidazol) es un antiamebiano, antigiardíaco y tricomonocida derivado 5 nitróimidazolico de vida media plasmática prolongada lo que facilita su dosificación única.

INDICACIÓN TERAPÉUTICA:

El Pack antiparasitario está indicado para el tratamiento de las parasitosis intestinales mixtas con presencia de nematodos intestinales y trofozoitos como la ameba y la giardia.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Albenzol, inhibe la captación de glucosa por parte del parásito, produciendo depleción del glucógeno con la consiguiente inmovilidad y muerte del parásito.

Ecuzol, actúa alterando la información del ADN del trofozoito o ameba, lo que da como resultado un producto inactivo o estéril.

CONTRAINDICACIONES:

En pacientes con hipersensibilidad a los componentes activos Albendazol y / o Secnidazol. No administrar durante el embarazo y lactancia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Administrar con precaución en pacientes con discrasias sanguíneas, enfermedades neurológicas o disfunción hepática.

EFFECTOS ADVERSOS:

En raras ocasiones se han presentado dolores abdominales, náuseas, exantemas, y sabor metálico en la boca.

DOSIS PARA NIÑOS de 2 a 12 años:

Primer día: Debe usarse primero el Albenzol, para tratar: *Áscaris lumbricoides*, *enterobius vermicularis*, *necátor americano*, *Ancylostoma duodenale* y *trichuris trichura*, mayores de 2 años, un frasco de 20 ml (400 mg) de Albenzol. Niños de 1 a 2 años, la mitad del frasco.

En casos como *Strongiloides stercoralis*, *Taenias* e *Hymenolepis Nana*, niños desde los 2 años de edad, 1 frasco de 20 ml por tres días seguidos. *Clonorchiasis*, *opistorchiasis*, niños desde 2 años de edad, 1 frasco de 20 ml dos veces al día por tres días consecutivos.

Quiste hidatídico, en niños mayores de 6 años, 1 frasco cada 12 horas con las comidas por 28 días.

Luego de haber concluido el tratamiento con el Albenzol suspensión, se recomienda Ecuzol-500 Polvo para suspensión (secnidazol) 30 mg / kg / día, junto con las comidas.

SOBREDOSIS:

No se han reportado mayores casos de sobredosis voluntaria.

Síntomas: Náuseas, vómito, dolor abdominal alto y/o cefalea.

Tratamiento: Sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta Médica

PRESENTACIÓN DEL PACK

ALBENZOL (1 caja - frasco x 20 ml + cucharadita dosificadora)

Reg. San. 7.324-2-10-03

ECUZOL - 500 (1 caja x frasco x 9,2 g de polvo para reconstituir 15 ml de suspensión Oral + vasito dosificador)

Reg. San. 5697-MAN-02-10

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

Albenzol Tabletas Masticables: Albendazol 200 mg
Ecuzol 1g Tabletas: Secnidazol 1g

FÓRMULA DE COMPOSICIÓN:

ALBENZOL Tabletas Masticables

Cada tableta masticable contiene:

Albendazol 200,00 mg

Excipientes: Lactosa de Flujo Rápido, Almidón para pasta, Estearato de Magnesio, Aerosil 200, Sacarina Sódica, Aroma Tutifruiti, Agua Deionizada, Acdisol

ECUZOL – 1g Tabletas

Cada tableta contiene:

Secnidazol 1g.

Excipientes: Almidón para pasta, Acdisol, Avicel pH 101, Magnesio Estearato, Aerosil.

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Albenzol (Albendazol) es un potente antihelmíntico que actúa frente a parásitos intestinales y tisulares en todas sus fases.

Ecuzol (Secnidazol) es un antiamebiano, anti giardiásico y tricomonocida derivado 5 nitróimidazolico de vida media plasmática prolongada lo que facilita su dosificación única.

INDICACIÓN TERAPÉUTICA:

El Pack antiparasitario está indicado para el tratamiento de las parasitosis intestinales mixtas con presencia de nematodos intestinales y trofozoitos como la ameba y la giardia.

MECANISMO DE ACCIÓN:

Albenzol, inhibe la captación de glucosa por parte del parásito, produciendo depleción del glucógeno con la consiguiente inmovilidad y muerte del parásito.

Ecuzol, actúa alterando la información del ADN del trofozoito o ameba, lo que da como resultado un producto inactivo o estéril.

CONTRAINDICACIONES:

En pacientes con hipersensibilidad a los componentes activos Albendazol y/o Secnidazol. No administrar durante el embarazo o cuando se supone su existencia, menores de 2 años, lactancia.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

En mujeres en edad fértil se recomienda administrar el antiparasitario durante la primera semana del ciclo menstrual y que tomen medidas anticonceptivas durante un mes luego de iniciado el tratamiento.

Administrar con precaución en pacientes con discrasias sanguíneas, enfermedades neurológicas o disfunción hepática. No ingerir bebidas alcohólicas durante el tratamiento hasta 24 horas después de la última dosis.

EFFECTOS ADVERSOS:

En raras ocasiones se han presentado dolores abdominales, náuseas, exantemas, y sabor metálico en la boca.

DOSIS PARA ADULTOS:

Primer día: Debe usarse primero el Albenzol, para tratar: *Áscaris lumbricoides*, *enterobius vermicularis*, *necátor americano*, *Ancylostoma duodenale* y *trichuris trichura*, masticar 2 tabletas de 200 mg de Albenzol. En casos como *Strongiloides vermicularis*, *Taenias e Hymenolepis Nana*, adultos y niños desde los 2 años de edad, masticar 2 tabletas de 200 mg por tres días seguidos. *Clonorchiasis*, *opistorchiasis*, 2 tabletas de 200 mg dos veces al día por tres días consecutivos. *Quiste hidatídico*, 2 tabletas de 200 mg cada 12 horas con las comidas por 28 días. Luego de haber concluido el tratamiento con el Albenzol, se recomienda Ecuzol (secnidazol) 2 tabletas de 1g en una sola toma, junto con las comidas.

SOBREDOSIS:

No se han reportado mayores casos de sobredosis voluntaria.

Síntomas: Náuseas, vómito, dolor abdominal alto y/o cefalea.

Tratamiento: Sintomático.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños

Venta Bajo Receta Médica

PRESENTACIÓN DEL PACK

ALBENZOL (1 caja x 2 tabletas masticables)

Reg. San. 7.323-2-04-04

ECUZOL - 1 g (1 caja x 2 tabletas)

Reg. San. 00535-1-MAN-06-06