

Albensec®

Suspensión
Tableta Masticable

Correcta Asociación de
Albendazol con Ecuazol



COMPOSICIÓN:

Tableta Masticable Adultos: 200 mg Albendazol y Secnidazol 1g
Suspensión Pediátrica: 20 ml de Albendazol y Secnidazol 500 mg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL.

DOSIFICACIÓN:

Albensec® En áscaris lumbricoides, enterobius vermicularis, necator americano, ancylostoma duodenalis y trichura, adultos y niños mayores de dos años masticar 400 mg (dos tabletas de 200 mg, o una tableta de 400 mg o un frasco suspensión de 20 ml) en una sola toma. Niños menores de dos años, la mitad de la dosis 200 mg del frasco suspensión 10 ml en una sola toma.

Dosificación:

PEDIATRICA (NIÑOS) ECUZOL® 500 mg p.p.s una vez reconstituida la fórmula equivale a 1 ml=30 mg de Secnidazol y se calculará en dosis ponderal de 30 mg/kg/día.

Amebiasis Intestinal: niños mayores de 2 años 30 mg/ kg/ en dosis única, un solo día.

Amebiasis hepática: 30 mg/kg/día, en una sola toma o repartida antes de las comidas por 5 días. Giardiasis: 30 mg/ kg/ en dosis única, un solo día.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Albendazol® en Helmintiasis simple o mixta. Nematodos (Ascaris lumbricoides), oxiuros (Enterobius vermicularis), ancylostomas (Necator americanus, Ancylostoma duodenale), Trichuris trichiura, Strongyloides stercoralis, cestodes (Taenia spp e Hymenolepsis nana, sólo en el caso de parasitismo asociado). Clonorchis sinensis, opisthorchiasis (Opisthorchis viverrini) y larva migratoria cutánea; giardiasis en niños (Giardia lamblia).

ECUZOL® 500 mg p.p.s. Está selectivamente indicado en la parasitosis intestinales con presencia de trofozoitos como ameba y la giardia, sea intestinal o extra intestinal. Para adultos ECUZOL® 1 g tabletas, además en tricomoniasis urogenital, giardiasis y vaginosis bacteriana.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

El Secnidazol es un derivado nitroimidazol que en estudios con animales han demostrado tener efectos mutagénicos cancerígenos. Hay que evitar ingerir bebidas alcohólicas o medicamentos que lo contengan ya que pueden provocar calor, enrojecimiento, vómitos, taquicardia. Como precaución este producto no debe ser usado por más de 10 días consecutivos, con excepción de los casos de infecciones originadas por gérmenes anaerobios y en lo posible el tratamiento se repetirá muy raras veces.

EMBARAZO:

A pesar de que no se han reportado efectos teratogénicos en la experimentación con animales, no se recomienda el uso de Secnidazol en el embarazo.

LACTANCIA: No se lo recomienda.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN:

Raros casos de vértigo han sido reportados.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a los componentes del fármaco. No usar en periodos de lactancia o de gestación, o en mujeres en que se sospeche embarazo. No administrar a menores de un año. En niños de entre uno y dos años, se administrará la mitad de la dosis.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Ninguna detallada.

EFFECTOS INDESEABLES: No se han descrito.

**MAYOR INFORMACIÓN FAVOR REVISAR
ALBENZOL Y ECUZOL PEDIÁTRICO POR SEPARADO.**