

## Albenzol® Suspensión Tabletas Masticables



Antiparasitario.  
Antihelmíntico de amplio  
espectro, albendazol.



### COMPOSICIÓN:

Albenzol® Cada Tableta Masticable: 200 mg y 400 mg Albendazol.  
Albenzol® Suspensión Cada 5 ml 100 mg de Albendazol

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN: VÍA DE ADMINISTRACIÓN: ORAL.

**DOSIFICACIÓN:** Albenzol® En áscaris lumbricoides, enterobius vermicularis, necator americano, ancylostoma duodenalis y trichura, adultos y niños mayores de dos años masticar 400 mg (dos tabletas de 200 mg, o una tableta de 400 mg o un frasco suspensión de 20 ml) en una sola toma. Niños menores de dos años, la mitad de la dosis 200 mg del frasco suspensión 10 ml en una sola toma.

Albenzol® en Strongyloidiasis, teniasis e hymenolepisis, adultos y niños desde los 2 años de edad: masticar 400 mg o un frasco completo 20 ml de suspensión en una toma, por 3 días seguidos.

Clonorchiasis, opisthorchiasis, adultos y niños desde los 2 años de edad: masticar 2 tabletas de 200 mg (o sea 400 mg) o un frasco completo (20 ml) de suspensión, 2 veces por día, durante 3 días consecutivos. Quiste hidatídico: dos tabletas de 200 mg (400 mg) cada 12 horas con las comidas por 28 días. En caso de recidivas: después de 3 semanas administrar un nuevo tratamiento. No es menester ayunar o tomar laxantes. Para lograr una mejor o completa curación, en la infección por Enterobius vermicularis se debe tratar, simultáneamente, a todas las personas que habitan en un mismo hogar.

## **INDICACIONES TERAPÉUTICAS:**

Albenzol® en Helminthiasis simple o mixta. Nemátodos (*Ascaris lumbricoides*), oxiuros (*Enterobius vermicularis*), ancylostomas (*Necator americanus*, *Ancylostoma duodenale*), *Trichuris trichiura*, *Strongyloides stercoralis*, cestodes (*Taenia* spp e *Hymenolepis nana*, sólo en el caso de parasitismo asociado). *Clonorchis sinensis*, opisthorchiasis (*Opisthorchis viverrini*) y larva migratoria cutánea; giardiasis en niños (*Giardia lamblia*).

## **ADVERTENCIAS:**

No se recomienda el tratamiento para el quiste hidatídico en niños menores de 6 años. En las mujeres, en la edad fértil, el Albenzol® deberá administrarse dentro del lapso de los 7 días después del inicio de la menstruación. Además, se deberá hacer prevenciones anticonceptivas durante y hasta después de un mes de terminar el tratamiento con Albenzol® en el quiste hidatídico.

## **CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad a los componentes del fármaco. No usar en periodos de lactancia o de gestación, o en mujeres en que se sospeche embarazo. No administrar a menores de un año. En niños de entre uno y dos años, se administrará la mitad de la dosis.

## **EFFECTOS INDESEABLES:**

Se han comunicado raros casos de malestares gastrointestinales: dolor abdominal, náuseas, mareos, cefalea.

## **SOBREDOSIS:**

Síntomas: Náuseas, vómitos, cefaleas. Tratamiento: Sintomático.

## **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Conservar a temperatura no mayor a 30°C. Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños.

## **PRESENTACIONES:**

Albenzol® 200 Tabletas masticables:	CAJA X 20 TABLETAS
Albenzol® 400 Tabletas masticables:	CAJA X 10 TABLETAS
Albenzol® Suspensión	Frasco x 20 ml (400 mg)