

Anautin®

Tabletas

Antiemético, anticinetótico.
Dimenhidrinato.



COMPOSICIÓN:

Cada TABLETA contiene Dimenhidrinato 50 mg.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

DOSIS:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 a 2 tabletas, 3 a 4 veces diarias.

Niños de 6 a 12 años: ¼ a ½ tableta cada 6 a 8 horas.

Niños mayores de 2 años: 5 mg/kg/día en 2 a 4 tomas diarias.

En viajes: la primera toma será 30 minutos antes del inicio.

INDICACIONES:

Antiemético, anticinetótico. Anautin® es muy efectivo en prevención y alivio de mareos, náuseas y vómitos por traslación y otras etiologías tales como trastornos laberínticos, procedimientos anestésicos o quirúrgicos, irradiaciones, quimioterapia, síndrome de Menière.

MECANISMO DE ACCIÓN:

La difenhidramina actúa como antihistamínico, anticolinérgico, antimuscarínico y antiemético y sus efectos los ejerce de la siguiente manera: Su efecto antihistamínico compitiendo con los receptores H1 de la histamina. Los efectos anticolinérgicos deprivan la estimulación vestibular y laberíntica que se producen en los viajes. Los efectos antimuscarínicos son responsables de la sedación. Y la acción antiemética como antagonista de la apomorfin.

ABSORCIÓN:

Es rápida y ampliamente distribuido por todo el organismo, incluido el sistema nervioso central donde desarrolla su acción antimuscarínica.

EXCRECIÓN:

Luego de metabolizarse en el hígado se elimina por vía renal.

CONTRAINDICACIONES: Pacientes con glaucoma, retención urinaria, hipertrofia prostática. En estados de gravidez y lactancia, su uso lo determinará el médico.

REACCIONES ADVERSAS:

Después de una dosis de Anautin® generalmente se produce decaimiento, pero también puede ocurrir una reacción paradójica de estimulación al SNC en niños y ocasionalmente en adultos con el tratamiento de este fármaco.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

No deberá administrarse Anautin® en conjunción con antibióticos aminoglucósidos ototóxicos, porque puede enmascarar los síntomas ototóxicos y llegar a un estado irreversible.

Tampoco se podrá usar a la vez con depresores del SNC, alcohol ni barbitúrico.

SOBREDOSIS:

En caso de ingesta accidental de sobredosis, se recomienda un lavado gástrico y tratamiento sintomático en un centro hospitalario.

PRECAUCIONES: Puede producir somnolencia, por lo que deberá advertir a los pacientes que mientras dure el tratamiento con este fármaco, deberán evitar el manejo de vehículos y/o maquinaria peligrosa.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase original a temperatura no mayor a los 30° C y protegido de la luz.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Anautin® Tabletas - Caja x 50