

Anulax®

Supositorios

Laxante



COMPOSICIÓN:

Anulax® ADULTOS cada supositorio contiene Bisacodil 10 mg.

Anulax® INFANTIL cada supositorio contiene Bisacodil 5 mg.

INDICACIONES: Anulax® es un laxante por contacto cuya actividad se manifiesta únicamente sobre la mucosa del intestino grueso, aumentando el peristaltismo sin ocasionar irritación.

El efecto laxante de Anulax® supositorios se realiza después de media hora de la aplicación.

Anulax® Indicado en el estreñimiento crónico o atónico simple; por cambio de dieta o de ambiente. En estados cardiocirculatorios o metabólicos. En el preoperatorio. En el parto. En la preparación para estudios radiológicos abdominales; recto sigmoideoscopias y colonoscopias. En hemorroides y fisuras anales.

Antes de los exámenes coprológicos para facilitar la toma de las muestras.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al bisacodilo. Enfermedades abdominales agudas: apendicitis, obstrucción intestinal, vómito, deshidratación intensa. Embarazo, lactancia.

REACCIONES ADVERSAS: En el transcurso, después de la administración, pueden ocurrir disturbios abdominales como dolores, calambres, diarreas.

PRECAUCIONES: El bisacodil en general es un producto que se debe usar por corto tiempo, de tres a cinco días, ya que puede propender a producir un intestino que requiera del uso frecuente de cualquier tipo de laxante. Y tener que usarlo continuamente.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Debido a que incrementa el peristaltismo del colon, no es recomendable el uso concomitante de ningún medicamento y de los supositorios de bisacodil. Tampoco el uso de hidroxido de aluminio y magnesio previo la colocación de los supositorios ya que impiden la acción del bisacodil.

DOESIFICACIÓN: Supositorios adultos: 1 supositorio (10 mg), 15 o 30 minutos antes de la evacuación deseada. Para la preparación de radiografías abdominales y de intervenciones quirúrgicas, se recomienda un supositorio por la mañana, a fin de lograr una evacuación completa de todo el tracto gastrointestinal. Supositorios para niños desde 4 años: 1 supositorio (5 mg) antes de la evacuación deseada.

ACCIÓN FARMACOLÓGICA:

Es un laxante de tipo estimulante de acción local sobre la mucosa del colon descendente facilitando la evacuación deseada en donde no va a verse alterado ni el proceso digestivo ni de absorción de los nutrientes.

ABSORCIÓN:

Sólo se absorben en pequeñas cantidades al llegar a hacer contacto con la mucosa del colon en donde después de la aplicación de un supositorio se hidroliza para formar El metabolito activo y actúa sobre la parte final del colon, específicamente en el proceso de evacuación, sin afectar la absorción ni la digestión.

EXCRECIÓN: Por tratarse de la vía rectal, la absorción es en muy pequeñas cantidades y se excretan casi completamente en las heces y otras más pequeñas por vía renal.

SOBREDOSIS: En caso de ingesta accidental de los supositorios induzca al vómito y dele tratamiento sintomático de soporte, y lleve al paciente a un Centro de Salud.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase original a temperatura no mayor a los 30^o C y protegido de la luz.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Anulax® Adultos	Caja por 5 supositorios
Anulax® niños	Cajas por 5 supositorios