

CLOMAZOL®-3 CREMA VAGINAL / CLOMAZOL® 3 CREMA Y ÓVULO (INSERTO VAGINAL) CLOTRIMAZOL

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

CLOMAZOL®-3 CREMA VAGINAL

COMPOSICIÓN: Cada 100 g de crema contiene: 2,00 g de Clotrimazol.

Excipientes: Propilenglicol, Propilparabeno, Lauril Sulfato de Sodio, Fosfato Dibásico de Sodio, Fosfato Monobásico de Sodio, Alcohol Cetílico, Aceite Mineral, Agua Purificada.

CLOMAZOL®-3 Óvulo (Inserto Vaginal)

COMPOSICIÓN: Cada Óvulo (Inserto Vaginal) contiene: 2,00 g de Clotrimazol.

Excipientes: Grasa Sólida

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:

Antimicótico de Amplio Espectro.

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vía de administración: Vaginal.

INDICACIONES TERAPEUTICAS:



CLOMAZOL®-3 Crema Vaginal y Óvulos (Inserto Vaginal):

Para el tratamiento de las infecciones vaginales simples o de etiología mixta y en casos de balanitis causadas por especies de Candida. Para el tratamiento concomitante del cónyuge se sugiere aplicar CLOMAZOL®-3 Crema Vaginal en la zona del glande.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE USO:



CLOMAZOL®-3 CREMA VAGINAL:

Aplice durante 3 noches consecutivas antes de acostarse: **1.** Destape el tubo y acople un aplicador descartable en el extremo abierto. **2.** Hale del émbolo hasta llenar el aplicador. **3.** Retire el aplicador del tubo, introdúzcalo profundamente en la vagina y presione el émbolo para liberar el contenido. **4.** Retire y deseche el aplicador.



CLOMAZOL®-3 Óvulo (Inserto Vaginal):

Es recomendable una vez al día durante 3 días consecutivos preferiblemente antes de dormir, realizar la aplicación acostada boca arriba (sobre la espalda), con las piernas ligeramente dobladas. Introducir lo más hondo en la vagina.



ADVERTENCIAS:

No es aconsejable realizar tratamiento vaginal durante la menstruación. La crema vaginal puede reducir la protección proporcionada por preservativos y diafragmas (productos que contienen látex). Este efecto es temporal y solo ocurre durante el tratamiento. Debe evitarse el contacto de la crema vaginal con los ojos.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al clotrimazol, derivados imidazólicos, o a cualquier componente de la fórmula.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se conocen.

PRECAUCIONES GENERALES: Si siente irritación local, descontinuar el tratamiento.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: No usar en niñas menores de 12 años.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS:

Muchos medicamentos no han sido estudiados en personas mayores, por lo que se desconoce si su eficacia es similar a la observada en adultos jóvenes. Aunque no hay datos específicos sobre el uso del imidazol vaginal en este grupo, no se esperan efectos distintos.

REACCIONES ADVERSAS:

En casos aislados pueden presentarse reacciones locales pasajeras, como: irritación, sensación de quemazón, picazón que no suelen determinar la supresión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros días del mismo. Si se observa cualquier otra reacción adversa, consulte a su médico.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

La duración del tratamiento es de 3 días, en caso de que se vuelva a presentar el flujo vaginal, lo debe repetir después de 7 días. No suspenda el tratamiento antes ni de forma brusca, ya que podría ser perjudicial para la evolución de su enfermedad y volver a aparecer las molestias de antes del tratamiento.

SOBREDOSIS:

Dada la concentración del principio activo y la vía de aplicación no es posible la intoxicación ni en el caso de ingestión accidental. Si se desarrollase alguna reacción de hipersensibilidad durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento, consultar inmediatamente con el médico, o acudir al centro de atención más cercano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños y a temperatura no mayor a 30° C

VENTA LIBRE

PRESENTACIONES COMERCIALES:

CLOMAZOL®-3 CREMA VAGINAL

Reg. San.: 7.183-2-04-04

Caja - Tubo x 20 g + 3 Aplicadores vaginales descartables + Inserto

Caja - Tubo x 8 g + 1 Aplicador vaginal descartable + Inserto (Muestra Médica)

CLOMAZOL®-3 Óvulo (Inserto Vaginal) Reg. San.: 7.167-2-03-04

Caja x 3 Óvulos (Inserto Vaginal) + Inserto

Caja x 1 Óvulo (Inserto Vaginal) + Inserto (Muestra Médica)