

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada 20 g de crema contiene 0.200 g de Clotrimazol

Excipientes: propileno glicol, propil paraben, lauril sulfato sódico, fosfato de soda dibásico, fosfato monosódico, alcohol cetílico, vaselina líquida, agua purificada.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:

Antimicótico de uso tópico.

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vía de administración: Tópica.

Dosificación: Se recomienda aplicar la crema de 2 a 3 veces al día en la zona afectada mediante fricción suave hasta su completa absorción.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Tratamiento tópico de las micosis superficiales de la piel, como:

Dermatomicosis-. Pie de atleta, herpes circinado, eczema marginado de hebra, tiña de los pies y de las manos, tiña del cuerpo, tiña inguinal, tiña ungular. Micosis de la barba y otomicosis. Pitiriasis versicolor y eritrasma.

ADVERTENCIAS:

Debe evitarse el contacto de la crema con los ojos. No aplicar la crema mientras se esté usando métodos anticonceptivos como el condón o diafragma.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al clotrimazol, derivados imidazólicos, o a cualquier componente de la fórmula.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

No se conocen.

PRECAUCIONES:

Embarazo y lactancia:

Estudios en animales no muestran efectos dañinos directos o indirectos en relación a la toxicidad reproductiva. Como precaución, es preferible evitar el uso de clotrimazol durante el primer trimestre del embarazo. Su uso debe estar indicado por un médico. En la lactancia los datos farmacodinámicos y toxicológicos disponibles en animales han demostrado la excreción de clotrimazol y sus metabolitos en la leche. Por lo que se debe interrumpir la lactancia durante el tratamiento con clotrimazol.

EFFECTOS INDESEABLES:

En casos aislados pueden presentarse reacciones locales pasajeras, como: Irritación, sensación de quemazón, picazón, que no suelen determinar la suspensión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros días del mismo. Si se observa cualquier otra reacción adversa, consulte a su médico.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

La duración del tratamiento depende de la localización y extensión del área afectada. En general se aconseja:

Dermatomicosis de 3 a 4 semanas.

Eritrasma y pitiriasis versicolor de 1 a 3 semanas. Debido a que las micosis cutáneas se muestran a veces muy rebeldes y en caso de no producirse la curación en el período establecido, el tratamiento deberá continuarse todavía por 2 semanas después de haber desaparecido todos los síntomas clínicos.

SOBREDOSIS:

En caso de sobredosis o ingestión accidental, no es posible que exista un riesgo de intoxicación aguda, sin embargo se recomienda consultar inmediatamente con el médico, o acudir al centro de atención más cercano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños y a temperatura no mayor a 30° C.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Clomazol Crema: Caja con 1 Tubo x 20 g

Reg. San. 7.283-2-09-03