

# Clomazol® 3 Crema

## Crema Vaginal Supositorio Vaginal

Antimicótico.



CLOMAZOL® - 3 Crema Vaginal

### COMPOSICIÓN:

Cada 100 g de Crema contiene: 2 g de Clotrimazol

CLOMAZOL® - 3 Supositorio Vaginal

### COMPOSICIÓN:

Cada Supositorio Vaginal contiene: 200 mg de Clotrimazol

### CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:

### VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vía de administración: Vaginal.

*Dosificación:* CLOMAZOL® - 3 Crema vaginal, se recomienda una carga del aplicador intravaginal, una vez al día, preferiblemente a la hora de acostarse, durante 3 días consecutivos.

Instrucciones para la correcta administración de la crema:

Es recomendable realizar lo aplicación al acostarse boca arriba (sobre la espalda), con las piernas ligeramente dobladas. Cada aplicador se usa una sola vez.

*Dosificación:* CLOMAZOL® - 3 Supositorio vaginal, se recomienda aplicación intravaginal, una vez al día, preferiblemente a la hora de acostarse, durante 3 días consecutivos. Con las piernas ligeramente dobladas.

### INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Tratamiento de las infecciones vaginales simples o de etiología mixta, causadas por especies de *Cándida* y con tratamiento complementario del cónyuge. Tratamiento de balanitis de origen candidiásico.

### MECANISMO DE ACCIÓN:

Altera la permeabilidad de la membrana fúngica, inhibiendo la síntesis del ergosterol.

**ABSORCIÓN:** Aplicada como tratamiento tópico en la vagina, su absorción es mínima, al punto de ser indetectable.

**EXCRECIÓN:** Las pequeñas cantidades que se absorben son metabolizadas en el hígado y excretadas en la bilis.

**ADVERTENCIAS:** No es aconsejable realizar tratamiento vaginal durante la menstruación. La crema vaginal puede reducir la protección proporcionada por preservativos y diafragmas (productos que contienen látex). Este efecto es temporal y solo ocurre durante el tratamiento. Debe evitarse el contacto de la crema vaginal con los ojos.

**CONTRAINDICACIONES:**

Hipersensibilidad al clotrimazol, derivados imidazólicos, o a cualquier componente de la fórmula.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:** No se conocen.

**PRECAUCIONES:** Embarazo y lactancia: Durante los 3 primeros meses de embarazo se aconseja consultar con el médico.

**EFFECTOS INDESEABLES:**

En casos aislados pueden presentarse reacciones locales pasajeras, como: irritación, sensación de quemazón, picazón que no suelen determinar la supresión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros días del mismo. Si se observa cualquier otra reacción adversa, consulte a su médico.

**DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:**

La duración del tratamiento lo indicara su médico. No suspenda el tratamiento antes ni de forma brusca, ya que podría ser perjudicial para la evolución de su enfermedad y volver a aparecer las molestias de antes del tratamiento.

**SOBREDOSIS:**

Dada la concentración del principio activo y la vía de aplicación no es posible la intoxicación ni en el caso de ingestión accidental. Si se desarrollase alguna reacción de hipersensibilidad durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento, consultar inmediatamente con el médico, o acudir al centro de atención más cercano.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños y a temperatura no mayor a 30° C.

**PRESENTACIÓN COMERCIAL:**

CLOMAZOL® - 3 Crema Vaginal

Caja con 1 tubo x 20 g más 3 aplicadores vaginales descartables.

Clomazol®-3 - Caja x 3 supositorios vaginales - 200 mg.