

CLOMAZOL®-3

CLOTRIMAZOL 2 g

**CREMA USO VAGINAL
CON 3 APLICADORES**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

COMPOSICIÓN: Cada 100 g de Crema contiene: 2 g de Clotrimazol

Excipientes: propileno glicol, propileno paraben, lauril sulfato sódico, fosfato de soda dibásico, fosfato monosódico, alcohol cetílico, vaselina líquida, agua purificada.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA: Antimicótico.

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN: Vía de administración: Vaginal.

DOSIFICACIÓN: Se recomienda una carga del aplicador intravaginal, una vez al día, preferiblemente a la hora de acostarse, durante 3 días consecutivos. Instrucciones para la correcta administración de la crema: Es recomendable realizar la aplicación al acostarse boca arriba (sobre la espalda), con las piernas ligeramente dobladas. Cada aplicador se usa una sola vez.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Tratamiento de las infecciones vaginales simples o de etiología mixta, causadas por especies de *Candida* y con tratamiento complementario del cónyuge. Tratamiento de balanitis de origen candidiásico.

ADVERTENCIAS: No es aconsejable realizar tratamiento vaginal durante la menstruación. La crema vaginal puede reducir la protección proporcionada por preservativos y diafragmas (productos que contienen látex). Este efecto es temporal y solo ocurre durante el tratamiento. Debe evitarse el contacto de la crema vaginal con los ojos.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al clotrimazol, derivados imidazólicos, o a cualquier componente de la fórmula.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se conocen.

PRECAUCIONES: Embarazo y lactancia: Durante los 3 primeros meses de embarazo se aconseja consultar con el médico.

EFFECTOS INDESEABLES: En casos aislados pueden presentarse reacciones locales pasajeras, como: irritación, sensación de quemazón, picazón que no suelen determinar la suspensión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros días del mismo. Si se observa cualquier otra reacción adversa, consulte a su médico.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: La duración del tratamiento lo indicará su médico. No suspenda el tratamiento antes ni de forma brusca, ya que podría ser perjudicial para la evolución de su enfermedad y volver a aparecer las molestias de antes del tratamiento.

SOBREDOSIS: Dada la concentración del principio activo y la vía de aplicación no es posible la intoxicación ni en el caso de ingestión accidental. Si se desarrollase alguna reacción de hipersensibilidad durante su utilización, deberá suspenderse el tratamiento, consultar inmediatamente con el médico, o acudir al centro de atención más cercano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños y a temperatura no mayor a 30°C

PRESENTACIÓN COMERCIAL: Clomazol® - 3 Crema Caja con 1 tubo x 20 g más 3 aplicadores vaginales descartables - Reg. San. 7.183-2-04-04