

# Colax®

## Polvo

Laxante especial para el colon  
(Cloruro de sodio, Cloruro de potasio,  
Bicarbonato de sodio)



**COMPOSICIÓN:** Cada frasco contiene:

Cloruro de sodio	1.46 g	Cloruro de potasio	0.75 g
Bicarbonato de sodio	1.68 g	Sulfato de sodio anhidro	12.90 g
Carbowax 3350	64.00 g	Contenido total	80.79 g

### INDICACIONES:

Para la limpieza del intestino antes de someter al paciente a cirugía o para la predisposición del colon para estudios diagnósticos de RX; gastroscopías, colonoscopías, rectosigmoidoscopías. Enemas.

### PREPARACIÓN:

Solubilizar con agua hervida fría, todo el contenido del envase hasta formar un litro de solución homogénea. Mantenerla en refrigeración para usarla dentro de las 48 horas siguientes.

### DOSIS:

Si el estudio está programado para la mañana, la noche anterior tomará una cena líquida, sin grasas, entre las 6 y 7 de la noche.

Dos horas después, comenzará, a tomar la solución a razón de un vaso cada 10 minutos, hasta completar la dosis prescrita. Al día siguiente, si le apetece, podrá tomar un desayuno líquido, sin grasa, hasta una hora antes del comienzo del estudio. Si éste fuere practicado en la tarde, comenzará a tomar la solución 5 horas antes de la fijada para el estudio, a razón de un vaso cada 10 minutos. La última comida será 2 horas antes del inicio de la ingesta de la solución, debiendo ser líquida y sin grasa.

### CONTRAINDICACIONES:

Embarazo, lactancia, apendicitis, vómitos, náuseas, enfermedades renales, dolores intestinales, estenosis del tracto digestivo.

### PRESENTACIÓN:

Colax® Envase con 80.79 g de polvo.