

# Digesflat®

## Tabletas

Tabletas Entéricas  
Enzimas digestivas, antiflatulento  
Pancreatina, Simeticona



### COMPOSICIÓN:

Cada Tableta contiene: Pancreatina 170 mg (equivalente a Proteasa 5.312,5 Unidades U.S.P., Amilasa 5.502 Unidades U.S.P, y Lipasa 1.394 Unidades U.S.P.; Simeticona (Dimetilpolisiloxano) 100 mg.

**CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:** Digestivo, antiflatulento

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:**

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** Oral

**DOSIFICACIÓN:**

DIGESFLAT® TOMAR 1 a 2 tabletas entéricas durante o después de las comidas. En la preparación para radiografías y/o ecografías abdominales: 2 tabletas entéricas, 3 ó 4 veces al día en los 2 días previos; en el día del examen: 2 tabletas entéricas, en ayunas.

**INDICACIONES:** Recomendado DIGESFLAT® en pancreatitis crónica que produce estados de absorción defectuosa. Para el aprovechamiento completo de las sustancias alimenticias en los trastornos de la digestión de grasas, albúminas e hidratos de carbono. Debilidad digestiva en postoperatorios, convalecencia y edad avanzada. Pancreopatías, meteorismo, flatulencia. Para desgasificación previa a radiografías y ecosonografías abdominales. Enfermedad fibroquística de los niños, como terapia sustitutiva.

**CONTRAINDICACIONES:** Obstrucción de los conductos biliares, pancreatitis aguda y hepatitis aguda.

**REACCIONES ADVERSAS:** Fenómenos tóxicos y alérgicos.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:** ninguna descrita.

**PRECAUCIONES:** Aunque no están establecidos con estudios efectos teratogénicos, evitar su uso durante embarazo y lactancia. No exceder de los 4 g al día.

**SOBREDOSIS:** En caso de ingesta accidental, induzca al vómito y dele tratamiento sintomático de soporte, y lleve al paciente a un Centro de Salud.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase original a temperatura no mayor a los 30° C y protegido de la luz.

**PRESENTACIÓN COMERCIAL:**

Digesflat® Tablet as Entéricas Caja por 50 Tablet as