

Flunazol® 150

Cápsulas

Antimicótico sistémico (Fluconazol)



COMPOSICIÓN:

Cada CÁPSULA contiene 150 mg de fluconazol.

ACCIÓN:

El fluconazol es un agente triazólico sintético de amplio espectro con acción fungistática y fungicida que le permite actuar eficientemente en las infestaciones de superficie y en las profundas (sistémicas). Se absorbe bien por la vía oral y no se ve afectado por los alimentos.

El fluconazol se distribuye en todos los fluidos corporales con fácil difusión. La vida media de eliminación, permite la administración de una dosis única de un día para la candidiasis vaginal.

POSOLOGÍA PARA ADULTOS:

Candidiasis vaginal y balanitis por cándida: 1 cápsula, dosis única.

Candidiasis de diversas localizaciones: 1 a 2 cápsulas diarias, debiendo ajustarse de acuerdo a la localización, a la indicación médica y a la respuesta clínica.

Tiñas: 1 cápsula semanal durante 2 a 4 semanas.

Tiña Pedis (pie de atleta): durante 6 semanas.

Onicomycosis (uñas): 1 a 2 cápsulas cada semana por el tiempo que dure el reemplazo de la uña infestada por una nueva.

Uñas de mano: 3 a 6 meses; Uñas de pie: 6 a 12 meses.

Prevención de infestaciones micóticas en pacientes transplantados, pacientes con cáncer: 2 cápsulas una vez al día; la duración del tratamiento la determina el médico, de acuerdo al procedimiento realizado y riesgo de contraer la infestación.

Uso en ancianos: Cuando no haya evidencia de deficiencia renal, se podrá adoptar la dosis normal.

SOBREDOSIS:

En caso de ocurrir el tratamiento sintomático (con medidas de soporte y lavado gástrico si es necesario) puede ser el más adecuado.

EFFECTOS INDESEABLES: El fluconazol es, por lo general, bien tolerado. Los efectos más comunes: náuseas, dolor abdominal, diarrea, flatulencias, rash, cefalea.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Se han reportado reacciones en su uso concomitante con sustancias tipo coumarina, fenitoina, ciclosporina, rifampicina, teofilina, terfenadina, cisapride, astemizol, rifabutina, benzodiazepinas. La hemodiálisis disminuye los niveles plasmáticos del fluconazol.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR Y

OPERAR MAQUINARIA: No existen reportes de que el fluconazol afecte la capacidad de manejar u operar maquinarias.

ADVERTENCIAS: No usar este producto después de la fecha de vencimiento. Mantenerlo en lugar fresco y seco a temperatura menor a 30° C. y fuera del alcance de los niños.

PREVENCIÓN: Pacientes inmunocomprometidos - Sistema inmunológico deprimido.

CONTRAINDICACIONES: Embarazo y lactancia. No administrar concomitantemente con terfenadina ni cisapride, puede causar eventos cardiacos.

PRESENTACIÓN: Flunazol®150 mg: Cajas por 2 cápsulas de 150 mg