

FUNGIREX® CREMA Y POLVO

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto antes de usar el producto y si tiene cualquier duda con respecto a la información consulte con su médico antes de administrar el medicamento. Siga las instrucciones de uso de este producto. Si las molestias persisten por más de siete días, consulte a su médico

FUNGIREX® Crema Tópica

ANTIMICÓTICO TÓPICO

COMPOSICIÓN: Cada 100 g de crema contiene Ácido Undecilénico 5 g, Undecilenato de Zinc 20 g
Excipientes: Lanolina, Petrolato, Alcohol Cetílico, Monooleato de Sorbitan, Polisorbato 80, Cera de Abeja Sintética, Propil Parabeno, Estearato de PEG 100, Metil Parabeno, Agua Purificada, Propilenglicol, Esencia Carina.

FUNGIREX® Polvo Tópico

ANTIMICÓTICO TÓPICO

COMPOSICIÓN: Cada 100 g de polvo contiene Ácido Undecilénico 2 g, Undecilenato de Zinc 20 g
Excipientes: Esencia Carina, Talco, Dióxido de Silicio coloidal.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA: Antimicótico de uso tópico.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION:

Vía de administración: Tópica.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento tópico de las micosis superficiales de la piel, tales como:

Dermatomicosis- FUNGIREX® en Pie de atleta, eczema marginado de hebra, tiña de los pies y de las manos, tiña circinada, tiña del cuerpo, tiña inguinal, tiña ungular. Micosis de la barba y otomicosis (oído externo). Pitiriasis versicolor y eritrasma.

DOSIS Y MODO DE USO: FUNGIREX® Se recomienda aplicar de 2 a 3 veces al día en la zona afectada mediante fricción suave hasta su completa adhesión en la piel.

El uso de FUNGIREX® será durante el tiempo recomendado. Debemos recordar que una vez lograda la curación el uso continuo de FUNGIREX® se lo puede considerar una buena costumbre de higiene y preventivo de nuevas apariciones de micosis de piel.

Dermatomicosis de 3 a 4 semanas, **Eritrasma y pitiriasis versicolor** de 1 a 3 semanas. Debido a que las micosis cutáneas se muestran a veces muy rebeldes y en caso de no producirse la curación en el período establecido, el tratamiento deberá continuarse todavía por 2 semanas después de haber desaparecido todos los signos y síntomas clínicos.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: La duración del tratamiento con FUNGIREX® depende de la localización y extensión del área afectada. En general se aconseja unas tres a cuatro semanas y luego de haber alcanzado la curación, se lo puede seguir usando como preventivo de nuevas infestaciones.

ADVERTENCIAS GENERALES: No debe ser administrado sobre mucosas o piel muy agrietada porque produce mucha irritación.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: No se han encontrado estudios que puedan determinar su uso o restricción.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: Sin información en base a estudios realizados.

PRECAUCIONES: Embarazo y lactancia: A pesar de ser un producto de uso tópico que no se absorbe en la piel, será mejor bajo prescripción médica evaluando el riesgo-beneficio.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a alguno de los componentes de la fórmula.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se conocen, ya que se trata de un producto que no se absorbe por lo que no llega a nivel sistémico.

EFFECTOS INDESEABLES: En casos aislados pueden presentarse reacciones locales pasajeras, como: Irritación, sensación de quemazón, picazón, que no suelen determinar la supresión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros días del mismo. Si se observa cualquier otra reacción adversa, consulte a su médico. Estas reacciones locales ceden al lavar la parte aplicada con FUNGIREX®.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR U OPERAR MAQUIARIA: No se ha descrito nada sobre este tema.

SOBREDOSIS: No se han reportado casos de sobredosis o ingestión accidental, no es posible que exista un riesgo de intoxicación aguda, sin embargo se recomienda consultar inmediatamente con el médico, o acudir al centro de atención más cercano para que reciba tratamiento de soporte.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños y a temperatura no mayor a 30° C.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

FUNGIREX® CREMA TÓPICA

Caja + 1 Tubo x 32 g

Reg. San. N°5.228-4-12-11

FUNGIREX® POLVO TÓPICO

Frasco x 45- 90-180 g

Reg. San. N° 2.675-5-09-04

FUNGIREX® U E INCOLORO

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto antes de usar el producto y si tiene cualquier duda con respecto a la información consulte con su médico antes de administrar el medicamento. Siga las instrucciones de uso de este producto. Si las molestias persisten por más de siete días, consulte a su médico

FUNGIREX® Solución

FUNGIREX® U

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene: Acido Benzoico 2 g, Acido Salicílico 2 g y Ácido Undecilénico 5ml. Excipientes: Clorobutanol, Verde Malaquita, Alcohol, Agua Desionizada

FUNGIREX® INCOLORO

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene: Acido Benzoico 2 g, Acido Salicílico 2 g, Ácido Undecilénico 5 ml y Clorobutanol 5 g. Excipientes: Alcohol, Agua Desionizada.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA: Antimicótico

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION:

Vía de administración: Tópica.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE USO: Se recomienda aplicar de 4 a 6 veces al día en la zona afectada mediante fricción suave hasta su completa adhesión en la piel. Si los síntomas persisten por más de 7 días consulte a su médico.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: Tratamiento tópico de las micosis superficiales de la piel, tales como: Dermatomicosis, en pie de atleta, eczema marginado de hebra, tiña de los pies y de las manos, tiña circinada, tiña del cuerpo, tiña inguinal, tiña ungular, micosis de la barba y otomicosis (oído externo), pitiriasis versicolor y eritrasma. Aplicar generosamente con un hisopo de algodón sobre la parte afectada durante el tiempo recomendado. Debemos recordar que una vez lograda la curación el uso continuo de FUNGIREX® se lo puede considerar una buena costumbre de higiene y preventivo de nuevas apariciones de micosis de piel.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: La duración del tratamiento depende de la localización y extensión del área afectada. En general se aconseja unas tres a cuatro semanas y luego de haber alcanzado la curación, se lo puede seguir usando como preventivo de nuevas infestaciones. Dermatomicosis de 3 a 4 semanas, Eritrasma y pitiriasis versicolor de 1 a 3 semanas. Debido a que las micosis cutáneas se muestran a veces muy rebeldes y en caso de no producirse la curación en el período establecido, el tratamiento deberá continuarse todavía por 2 semanas después de haber desaparecido todos los síntomas clínicos.

ADVERTENCIAS GENERALES: No debe ser administrado sobre mucosas o piel muy agrietada porque produce mucha irritación.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: No se han encontrado estudios que puedan determinar su uso o restricción.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: Sin información en base a estudios realizados.

PRECAUCIONES Embarazo y lactancia: A pesar de ser un producto de uso tópico que no se absorbe en la piel, será mejor bajo prescripción médica evaluando el riesgo - beneficio.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a alguno de los ácidos grasos o a cualquier componente de la fórmula.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se conocen, ya que se trata de un producto que no se absorbe por lo que no llega a nivel sistémico.

EFFECTOS INDESEABLES: En casos aislados pueden presentarse reacciones locales pasajeras, como: Irritación, sensación de quemazón, picazón, que no suelen determinar la supresión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros días del mismo. Si se observa cualquier otra reacción adversa, consulte a su médico. Éstas reacciones locales ceden al lavar la parte aplicada con FUNGIREX®

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR U OPERAR MAQUINARIA: No se ha descrito nada sobre este tema.

SOBREDOSIS: No se han reportado casos de sobredosis o ingestión accidental, no es posible que exista un riesgo de intoxicación aguda, sin embargo se recomienda consultar inmediatamente con el médico, o acudir al centro de atención más cercano para que reciba tratamiento de soporte.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservarse fuera del alcance de los niños y a temperatura no mayor a 30° C.

PRESENTACIONES COMERCIALES:

FUNGIREX® - U

Frascos por 60 ml. Reg. Sanit. N° 3.611-4-05-03

FUNGIREX® INCOLORO

Frascos por 60 ml. Reg. Sanit. N° 6.782-3-11-11