

HISTACALM® CLEAR LOCIÓN

Clorhidrato de Pramoxina, Acetato de Zinc, Alcanfor

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y si tiene cualquier duda con respecto a la información consulte con su médico antes de administrar el medicamento. Siga las instrucciones de uso de este producto. Si las molestias persisten por más de siete días consulte con su médico.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA: Antipruriginoso

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vía de administración: Tópica

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene: Clorhidrato de Pramoxina 1,0750 g, Acetato de Zinc 0,1200 g, Alcanfor 0,0900 g.

EXCIPIENTES: Hidroxietil Celulosa, Glicerina, Etanol, Fragancia de Rosas, Polisorbato 80, Metilparabeno, Propilparabeno, Ácido Cítrico Monohidrato, Citrato de Sodio, Agua Purificada, Polioxilglicéridos de Caprilcaproilo

INDICACIONES: HISTACALM® CLEAR LOCIÓN previene la pañalitis, en caso de que ya tenga alivia las molestias por el ardor que causan. HISTACALM® CLEAR LOCIÓN calma y alivia de inmediato el prurito y el ardor, dejando una agradable sensación de frescura en la piel seca, inflamada o pruriginosa. Especialmente útil en casos de urticaria, eritema solar, irritaciones, pruritos de etiologías diversas, picaduras de insectos.

MODO DE USO: Limpiar y secar bien las partes afectadas. Aplicar de 3 a 4 veces diarias, frotando con suave masaje en la parte afectada.

Si los síntomas persisten por más de 7 días, suspender el tratamiento y consultar con su médico.

PRECAUCIONES GENERALES: No utilizar en piel con fisuras, en áreas exudadas o ampolladas, ni en superficies mucosas. Evitar el contacto con los ojos.

PRECAUCIONES EMBARAZO Y LACTANCIA: No hay estudios que demuestren que haga daño al feto,

ni que se absorba, ni se excrete en leche materna por lo que es preferible usar bajo vigilancia médica.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: No usar en menores de 2 años. Ni mayor dosis que la recomendada.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: No usar más de las dosis recomendadas, debido a la delgadez de la piel en los adultos mayores.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes, embarazo y lactancia y niños menores de dos años consultar con el médico.

POSIBLES EFECTOS ADVERSOS: Irritación local de la piel, en cuyo caso, debe ser lavada y retirada la loción con abundante agua.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No existe evidencia de que por la vía tópica haya absorción de sus componentes a nivel sistémico, razón por la cual no se considera la interacción con otros medicamentos.

ACCIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR: Ninguna descrita.

SOBREDOSIS: En caso de ingesta accidental induzca al vómito y dele tratamiento sintomático de soporte, y lleve al paciente a un Centro de Salud. En muy raros casos por uso en extensas áreas del cuerpo y con piel lesionada o capa córnea (de la piel) lesionada se pudieran dar.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase original a temperatura no mayor a los 30° C y protegido de la luz.

VENTA LIBRE

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

HISTACALM® CLEAR LOCIÓN Reg. San. N° 5783-MAN-05-10
Frasco x 100 ml + Inserto

Elaborado por **Laboratorios Dr. A. Bjarner C. A.** - Guayaquil - Ecuador
Calicuchima 601 y Noguchi / Casilla 01-09-1292
Email: info@grupoeecu.com
www.laboratoriosbjarnar.com