

Larotin®

Jarabe Tabletas

Antihistamínico no
sedante de 24 horas
de continua actividad
Loratadina



COMPOSICIÓN:

LAROTIN® JARABE: Cada 5 ml contiene: Loratadina 5 mg

LAROTIN® Tabletas: Cada TABLETA contiene: Loratadina 10 mg

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral

DOSIFICACIÓN: Adultos y niños mayores de 12 años: 1 tableta o 2 cucharaditas (10 mg) cada 24 horas. Niños de 2 a 12 años de edad: Jarabe: Más de 30 kg de peso corporal: 10 ml (2 cucharaditas)=10 mg. Entre 15 y 30 kg peso corporal: 5 ml (1 cucharadita) = 5 mg. Menores de 15 kg peso corporal: 2,5 ml (½ cucharadita) = 2,5 mg. Niños de 1 a 2 años de edad: según criterio médico.

MECANISMO DE ACCIÓN: La loratadina es un antihistamínico tricíclico que tiene una selectiva y periférica acción antagonista sobre los receptores H₁ de las histaminas. No ingresa al Sistema Nervioso Central, razón por la cual no produce sedación ni somnolencia.

ABSORCIÓN: Se absorbe por vía gastrointestinal y a través del torrente sanguíneo pasa por el hígado, se metaboliza por la vía del citocromo P450 donde se desdobra a desloratadina que es su metabolito activo.

EXCRECIÓN: la excreción de la loratadina es del 40 % por vía fecal y otro 40% por la renal.

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a la droga. Embarazo no se lo recomienda ya que no hay evidencia controlada en humanos sobre su daño. Mujeres que están dando de lactar a niños deben suspender la lactancia en caso les sea muy necesario el uso de la loratadina, ya que hay evidencia de que se excreta por leche materna.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: Cuando LAROTIN® se administra concomitantemente con alcohol, no se produce ningún efecto potencial.

Hay incremento de concentración de plasma AUC de loratadina o su metabolito activo desloratadina, cuando se lo usa en combinación con Ketoconazol, Eritromicina, Claritromicina (macrólidos),

PRECAUCIONES: En mayores de 12 años adultos que tengan daño renal con filtración menor igual 30 mL/minuto la dosis inicial será de 10 mg pasando un día. Para menores de 6 a 12 años con fallo renal la dosis será de 5 mg pasando un día. Falla Hepática también se tomará en cuenta para la dosificación en mayores de 12 años y adultos se puede recomendar 10 mg pasando un día, así también a menores de desde 6 a 12 años 5 mg pasando un día.

EFFECTOS SECUNDARIOS: LAROTIN® ha demostrado carencia de propiedades sedantes y anticolinérgicas. La ocurrencia de fatiga, sedación, dolor de cabeza y sequedad de la boca, fueron comunicados en raras ocasiones.

INDICACIONES: LAROTIN® es un antihistamínico de acción prolongada que se une selectivamente a los receptores de histamina periféricos y una baja afinidad por los receptores ubicados en el S.N.C.

Su potente y sostenida acción y la baja afinidad por los receptores H1 cerebrales, le confieren a LAROTIN® propiedades que facilitan el control de los estados alérgicos. LAROTIN® no produce sedación ni somnolencia, no baja el rendimiento psicomotor, bastando una ingesta cada 24 horas. El rápido inicio de su acción, su potente actividad antihistamínica, superior a otros tradicionales antihistamínicos, la carencia de sedación más su prolongada vida media plasmática, conducen a LAROTIN® para una terapia de alta eficacia y seguridad en los siguientes síntomas y signos asociados con la alergia: rinitis alérgica, urticaria pigmentada, urticaria crónica ideopática, dermatitis por contacto, alergias alimentarias, alergias medicamentosas, prurito y ardor oculares.

SOBREDOSIS: Por sobredosis en adultos luego de ingestas de entre 40 y 180 mg, se han reportado casos de taquicardia, cefalea, somnolencia.

El tratamiento es sintomático y debe empezar con el vaciado gástrico o inducir al vómito. La Loratadina no se remueve por diálisis y se desconoce se la puede remover por diálisis peritoneal.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR: Se debe aclarar a las personas que operan maquinarias y vehículos que tengan cuidado de no exceder la dosis recomendada.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Conservar a temperatura no mayor a 30°C y fuera del alcance de los niños

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Larotin® Frasco por 60ml - Larotin® Tabletas Caja x 20