

PULMOSAN®

DEXTROMETORFANO, GUAIFENESINA

JARABE
120ml

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

PULMOSAN® Jarabe 120 ml

Antitusígeno, Expectorante
Dextrometorfano, Guaifenesina
Clasificación Terapéutica
Antitusígeno - Expectorante

COMPOSICIÓN: Cada cucharadita (5 ml) contienen: Dextrometorfano bromhidrato 15 mg, Guaifenesina 50 mg

EXCIPIENTES: Mentol, Ácido Cítrico, Citrato de Sodio, Sacarina Sódica, Metil Paraben, Propil Paraben, Azúcar, Sorbitol solución, Glucosa Líquida, Propilen Glicol, Color Rojo FDC N° 40, Saborizante de Durazno, Saborizante de Vainilla, Alcohol, Agua Purificada

Dosificación y Vía de Administración:

Vía de Administración: Oral

DOSIFICACIÓN: Adultos y niños desde 12 años: 2 cucharaditas cada 4 horas.

Niños desde 6 a 12 años: 1 cucharadita cada 4 horas.

Niños de menores de 6 años: según criterio médico.

PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS: PULMOSAN® Jarabe el Dextrometorfano ejerce un enérgico efecto antitusígeno similar al de la codeína pero sin causar dependencia, ni depresión respiratoria actuando de manera específica en el eje de la tos, y es bien tolerado por niños y adultos.

La guaifenesina fluidifica la mucosidad acumulada en las vías respiratorias, facilitando su expectoración calmando la tos.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS: PULMOSAN® Jarabe Control de la tos, por tos síntomas de la gripe, resfriado o por infecciones agudas o subagudas del sistema respiratorio, alivio de la tos alérgica.

PRECAUCIONES: SI LOS SÍNTOMAS PERSISTEN POR MÁS DE 7 DÍAS DEBE DESCONTINUAR EL TRATAMIENTO, O CONSULTAR CON SU MÉDICO.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: no usar en menores de 2 años. Mayores de 2 años según prescripción médica.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: En adultos mayores se puede usar la mitad de la dosis o sea una cucharadita de 5 ml cada 4 a 6 horas, salvo que previo exámenes de laboratorio nos den valores normales de función renal y hepática.

CONTRAINDICACIONES: Su uso está contraindicado en niños menores de dos años. Hiper sensibilidad a alguno de sus componentes, pacientes con diabetes, úlcera péptica, hipertiroidismo. Pacientes que se tratan con inhibidores de la MAO no tomar esta medicación para la tos crónica o persistente, como ocurre en el tabaquismo, asma, enfisema o tuberculosis, salvo criterio médico. No administrar a personas con epilepsia ya que pueden aumentar las convulsiones.

Contraindicado en el embarazo o cuando se supone su existencia, y durante la lactancia. Si los síntomas persisten consulte a su médico.

REACCIONES ADVERSAS: Puede ocasionar náuseas, mareos, vómitos, nerviosismo, somnolencia.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR: Ninguna descrita.

SOBREDOSIS: En caso de sobredosis llevar al paciente al Centro de Salud más cercano para que se le administre tratamiento de soporte.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Mantener el frasco bien tapado. Conservar a temperatura no mayor de 30° C y fuera del alcance de los niños.

VENTA LIBRE

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

PULMOSAN® Jarabe Frasco x 120 ml.

Frasco x 60 ml

Frasco x 240 ml