

# SCABIOLAN® SOLUCIÓN

## BENZOATO DE BENCILO

### FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

### COMPOSICIÓN:

Cada 100 mL contienen: BENZOATO DE BENCILO 30 mL

**EXCIPIENTES:** Salicilato de Metilo, Benzocaína, Etanol.

### CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:

ESCABICIDA Y PEDICULICIDA

### VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

**Vía de administración:** Uso Tópico

**INDICACIONES TERAPEUTICAS:** indicado en los procesos dérmicos de la sarna (escabiosis) o de infestación de piojos y liendres en cuero cabelludo (pediculosis capiti) o ladillas (pediculus pubis), en las áreas genitales externas.

**MODO DE USO:** En caso de sarna (escabiosis), luego de un baño con agua y jabón en el cual se deja muy limpia, lista y seca la parte afectada, se aplica una capa de la solución en la piel desde el cuello hasta los pies, cuando se haya secado esta primera aplicación, se puede aplicar una segunda capa. Algunos consideran que se lo puede hacer durante dos días. Los adultos pueden usar hasta 30 mL de la solución y los menores hasta 20 mL. Dejar secar en el cuerpo y tomar un baño después de 12 o 24 horas, para retirar la loción aplicada. Evitar el contacto de Scabiolan con ojos, cara y mucosas.

En el caso de piojos y liendres (Pediculosis capiti) o pediculosis pubis, aplicarse en el cuero cabelludo y pelo, evitando que penetre a los ojos o pubis evitar que penetre en la vagina.

En ambos casos se debe remover la solución después de 12 o 24 horas. Si fuera necesario repetir la acción debe ser hecha después de 7 días.

**PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS:** No se encuentran disponibles estudios sobre el uso en niños pero es preferible bajo dirección de un médico.

**PRECAUCIONES GERIÁTRICAS:** Es preferible el uso bajo criterio médico.

**EFFECTOS ADVERSOS:** cuando se lo aplica de manera recomendada no tiene ningún inconveniente, ya que se ha notado baja toxicidad. Una leve inflamación o irritación de la piel puede ocurrir, especialmente en las áreas genitales, reacciones de tipo alérgico. Evitar el contacto con la cara, ojos, membranas, mucosas. La aplicación repetida del benzoato de bencilo puede producir dermatitis de contacto.

En pacientes que han tenido estos inconvenientes pueden persistir la sensación de comezón por una o más semanas, lo que no significa que se debe volver a aplicar el tratamiento.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad conocida al Benzoato de Bencilo o a alguno de sus componentes.

**EMBARAZO Y LACTANCIA:** No se encuentra disponible información pero es mejor evitar el uso, o lo que el médico recomiende según la evaluación riesgo/beneficio.

**INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:** No está documentada la interacción medicamentosa.

**PRECAUCIONES GENERALES:** NO INGERIR ESTA SOLUCIÓN

**SOBREDOSIS:** En los animales que se han tomado por accidente el benzoato de bencilo, se ha notado excitación del Sistema Nervioso Central, con daño y hasta muerte. En caso de sobredosis accidental o intencional consulte con urgencia a su médico, o acudir al centro de salud más cercano.

### CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase original, a temperatura no mayor a 30° C y protegido de la luz.

### PRESENTACIÓN COMERCIAL:

SCABIOLAN® SOLUCIÓN Reg. San. N° 03482-MAN-03-05

Caja - Frasco x 60 mL + Inserto

Caja - Frasco x 120 mL + Inserto

Caja - Frasco x 30 mL + Inserto (Muestra Médica)