

SILVADIN® CREMA

SULFADIAZINA DE PLATA AL 1%

FRASCOS DE
60 y 150 g

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y si tiene cualquier duda con respecto a la información consulte con su médico antes de administrar el medicamento. Siga las instrucciones de uso de este producto. Si las molestias persisten por más de siete días consulte con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 g contiene Sulfadiazina de Plata al 1%
Excipientes: Plastibase y Metilparabeno

VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Tópica

DOSIFICACIÓN:

Una ligera capa de SILVADIN® CREMA debe ser aplicada sobre la gasa que va a recubrir la parte afectada, sea en una úlcera por pié diabético o por una quemadura de segundo o tercer grado que no exceda el 5% de la superficie corporal y que será hecho según la actividad y necesidad del pacientes y teniendo en cuenta la necesidad de que el paciente sea bañado a diario.

INDICACIONES TERAPEUTICAS:

Actúa como quimioterápico gracias a la sulfadiazina y como antiséptico, por la plata. Antibacteriano de superficie, heridas traumáticas infectadas. Profilaxis y tratamiento de la infección en heridas y quemaduras de 2do. y 3er. grados.

En los diabéticos: para aplicación en las llagas de los pies, para ayudar a combatir la infección, eliminando el tejido necrótico, favoreciendo el crecimiento de tejido nuevo y saludable.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad a las sulfamidas, embarazo, niños prematuros, recién nacidos durante el primer mes de vida.

PRECAUCIONES GENERALES:

Proteja el producto de la exposición a la excesiva luz solar. Han sido reportadas eventualmente, dolor, ardor, comezón. Cuando es aplicada la sulfadiazina de plata en largas extensiones del cuerpo, la sulfadiazina se puede absorber de manera sistémica y puede dar paso a reacciones alérgicas típicas de las sulfonamidas, que pueden incluir anemia hemolítica especialmente en pacientes con deficiencia del glucosa 6 fosfato deshidrogenasa, agranulocitosis, anemia aplásica, trombocitopenia, leucocitopenia, reacciones dermatológicas y de hipersensibilidad.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS:

No debe usarse en prematuros o en niños menores de dos años, porque produce Kernicterus.
Carcinogénesis: No existe evidencia suficiente que lo indique.

PRECAUCIONES EN EMBARAZO Y LACTANCIA:

No se recomienda Sulfadiazina de Plata en mujeres embarazadas, a menos que su uso sea estrictamente necesario, y tener en cuenta el riesgo/beneficio, especialmente si la superficie corporal es mayor al 20% de la superficie corporal. **Lactancia:** No se lo debe usar ya que está comprobado que produce Kernicterus.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS:

Nada descrito al respecto de cuidados especiales y/o adicionales.

ADMINISTRACIÓN Y POSOLOGÍA:

Preferentemente (curación a cielo cerrado) con espátula y guantes estériles untar el SILVADIN® CREMA sobre apósitos igualmente estériles y aplicarlos sobre la superficie corporal quemada. Repetir el procedimiento de acuerdo con el criterio del médico.

DURACION DEL TRATAMIENTO:

El tratamiento con SILVADIN® CREMA debe ser llevado hasta cuando en la parte afectada vaya apareciendo nuevamente la piel que recubra la superficie lacerada sea por quemadura de segundo o tercer grado como por ulcera varicosa o pié diabético.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONducIR:

No se tiene estudios al respecto de algún tipo de afectación por el uso de SILVADIN® CREMA.

SOBREDOSIS:

La sulfadiazina de plata no se absorbe, ya que actúa al contacto con la superficie en donde es aplicada, por lo tanto no se genera sobredosis, salvo que la zona afectada por quemadura sea una gran extensión de superficie corporal, pero esto será de tratamiento en centro especializado de quemaduras donde sabrán aplicar los cuidados adecuados.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar a temperatura no mayor a 30° C protegido del sol y fuera del alcance de los niños.

VENTA LIBRE

PRESENTACIONES COMERCIALES:

SILVADIN® CREMA

Frasco x 60 g + inserto

Frasco x 150 g + inserto

Reg. San.: 04923-MAN-07-07