

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

CLASIFICACION TERAPEUTICA: Antiemético, anticinetótico.

COMPOSICIÓN:

Cada TABLETA contiene Dimenhidrinato 50 mg.

Excipientes: Celulosa microcristalina, Estearato de magnesio, Povidona, Almidón modificado, Etanol, Croscarmelosa Sódica.

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION:

Via de administración: Oral.

DOSIS:

Adultos y niños mayores de 12 años: 1 a 2 tabletas, 3 a 4 veces diarias.

Niños de 6 a 12 años: $\frac{1}{4}$ a $\frac{1}{2}$ tableta cada 6 a 8 horas.

Niños mayores de 2 años: 5 mg/kg/día en 2 a 4 tomas diarias.

En viajes: La primera toma será 30 minutos antes del inicio.

INDICACIONES:

Antiemético, anticinetótico. Anautin® es muy efectivo en prevención y alivio de mareos, náuseas y vómitos por traslación y otras etiologías tales como trastornos laberínticos, procedimientos anestésicos o quirúrgicos, irradiaciones, quimioterapia, síndrome de Menière.

CONTRAINDICACIONES:

Pacientes con glaucoma, retención urinaria, hipertrofia prostática. En estados de gravidez y lactancia, su uso lo determinará el médico.

REACCIONES ADVERSAS:

Después de una dosis de Anautin® generalmente se produce decaimiento, pero también puede ocurrir una reacción paradójica de estimulación al SNC en niños y ocasionalmente en adultos con el tratamiento de éste fármaco.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

No deberá administrarse Anautin® en conjunción con antibióticos aminoglucósidos ototóxicos, porque puede enmascarar los síntomas ototóxicos y llegar a un estado irreversible.

Tampoco se podrá usarlo a la vez con depresores del SNC, alcohol ni barbitúricos.

SOBREDOSIS:

En caso de ingesta accidental de sobredosis, se recomienda un lavado gástrico y tratamiento sintomático en un centro hospitalario.

PRECAUCIONES:

Puede producir somnolencia, por lo que deberá advertir a los pacientes que mientras dure el tratamiento con este fármaco, deberán evitar el manejo de vehículos y/o maquinaria peligrosa.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase original a temperatura no mayor a los 30° C y protegido de la luz.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

ANAUTIN® Tabletas Reg. San. 3.049-4-09-03

Caja x 5 ristras x 10 tabletas c/u + inserto

Caja x 100 ristras x 10 tabletas c/u + inserto

Caja x 10 blisters x 10 tabletas c/u + inserto

Caja x 1 blister x 10 Tabletás c/u + Inserto

Caja x 10 ristras x 10 tabletas c/u + inserto

Caja x 5 blisters x 10 tabletas c/u + inserto

Caja x 100 blisters x 10 Tabletás c/u + Inserto

Caja x 1 blister x 2 tabletas c/u + Inserto - Muestra Médica