

NAPAFEN® SIN ALCOHOL

PARACETAMOL 100 mg / ml

**30 ml
GOTAS**

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada 100 ml contiene: Paracetamol 10 g

Excipientes: Glicerina, carbowax 1450, ácido cítrico, FD&C Rojo #40, Sacarina Sódica, aroma ron, esencia de vainilla, agua purificada.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:

Analgésico - antipirético.

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vía de administración: Oral.

Dosificación:

Puede establecerse un esquema de dosificación de 15 mg/kg por toma, cada 6 horas, con una dosis total de 60 mg/kg/día, especialmente en niños menores de 1 año.

Si a las 3 - 4 horas de administración no se obtienen los efectos deseados, se puede adelantar la dosis cada 4 horas, en cuyo caso se administrarán 10 mg/kg.

La administración del preparado está supeditada a la aparición de los síntomas dolorosos o febriles.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

El Napafen® Sin Alcohol Gotas es efectivo para el tratamiento del dolor leve a moderado incluyendo: dolor de cabeza, migraña, dismenorrea, dolor de garganta, dolores musculares, fiebre, dolor después de una vacuna, dolores dentales y alivio del malestar de la gripe y/o resfrío.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

Producto de uso delicado, adminístrese por prescripción y bajo vigilancia médica.

No exceder la dosis recomendada. En pacientes con enfermedades del riñón, corazón o pulmón y en pacientes con anemia (disminución de la tasa de hemoglobina en la sangre, a causa o no, de una disminución de glóbulos rojos), consultar con el médico antes de tomar el medicamento.

El consumo de bebidas alcohólicas puede provocar que el paracetamol produzca daño en el hígado. Si el dolor se mantiene durante más de 3 días en niños o 5 días en adultos (2 días para el dolor de garganta) o la fiebre durante más de 3 días, o empeoran o aparecen otros síntomas, se debe suspender el tratamiento y consultar al médico. Evitar tratamientos prolongados.

CONTRAINDICACIONES:

Contraindicado en personas con hipersensibilidad conocida al paracetamol. No debe administrarse a personas que sufran de enfermedad hepática o renal graves.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Las drogas inductoras de las enzimas hepáticas como: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina pueden aumentar la hepato toxicidad del paracetamol.

El efecto anticoagulante de la warfarina y de otros anticoagulantes cumarínicos, puede verse aumentado por el uso diario, regular y prolongado de paracetamol, aumentando el riesgo de sangramiento; dosis ocasionales de paracetamol, no tienen efecto significativo.

En caso de requerir atención médica por otras razones no olvide mencionar que está tomando este medicamento.

EFFECTOS INDESEABLES:

Napafen® Sin Alcohol Gotas en general es bien tolerado, alivia el dolor sin producir acidez. Sin embargo, si cualquiera de los siguientes síntomas aparece deje de tomar el medicamento y consulten con su médico: Síntomas de alergias (ronchas, hinchazón, picazón), ojos o piel amarilla, diarrea, pérdida del apetito, náuseas, vómitos o deposiciones con sangre.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

La duración de su tratamiento con Napafen® Sin Alcohol Gotas se la indicará su médico.

No suspenda el tratamiento antes ni de forma brusca, ya que podría ser perjudicial para la evolución de su enfermedad y volver a aparecer las molestias de antes del tratamiento.

SOBREDOSIS:

La intoxicación con Paracetamol es peligrosa y más en los pacientes ancianos y en los niños pequeños (sobredosis terapéutica o intoxicación accidental) en los que puede resultar mortal, por lo que se recomienda concurrir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano.

Los síntomas que se manifiestan habitualmente en las primeras 12 a 24 horas son: palidez, náuseas, vómitos, sudoración, anorexia y dolores abdominales.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños, y a temperatura no mayor a 30°C.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Napafen® Sin Alcohol Gotas Caja x 1 frasco x 30 ml

Reg. San. 03201-MAN-08-04

NAPAFEN® 500

ACETAMINOFENO (PARACETAMOL) 500 mg

TABLETAS

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y verifique que este medicamento corresponde al indicado por su médico, antes de su administración. Contiene información importante acerca de su tratamiento. Si tiene cualquier duda o no está seguro de algo, consulte con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada Tableta contiene: Acetaminofeno (Paracetamol) 500 mg.
Excipientes: Lactosa Monohidrato, celulosa microcristalina, Estearato de Calcio, croscarmelosa sódica, Dioxido de Silicio Coloidal.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:

Analgésico-antipirético

VIA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACION:

Vía de administración: Oral.

Dosificación: Adultos: Dosis de 1 a 2 tabletas (500-1000 mg) cada 4-6 horas. No se excederá de 4 g cada 24 horas.

Niños: Puede establecerse un esquema de dosificación de 10 mg/kg de peso, por toma, con un intervalo mínimo de 4 horas, o bien de 15 mg/kg de peso, por toma, cada 6 horas. Las dosis siguientes pueden repetirse con un intervalo mínimo de 4 horas sin exceder de un total de 5 tomas en 24 horas.

Niños de 6 a 10 años: Media tableta (250 mg) cada 4-6 horas; máximo 3 tabletas (1500 mg) cada 24 horas.

Niños de 11 años: Media tableta (250 mg) cada 4-6 horas; máximo 5 tabletas (2500 mg) cada 24 horas.

Adolescentes desde 12 años: 1 tableta (500 mg) cada 4-6 horas; máximo 6 tabletas (3000 mg) cada 24 horas.

Pacientes con insuficiencia renal: Se recomienda aumentar el intervalo de administración a 6 horas en los pacientes con daño renal moderado (tasa de filtración glomerular entre 10 a 50 ml/min), y a 8 horas en los pacientes cuya tasa de filtración glomerular sea menor de 10 ml/min. La vida media del Acetaminofeno (Paracetamol) se prolonga en los pacientes con daño hepático, pero no se ha definido la necesidad de realizar ajustes en la dosis del medicamento en este grupo de pacientes y en general, se considera seguro administrar la dosis normal en pacientes con padecimientos hepáticos crónicos estables.

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

El Acetaminofeno (Paracetamol) es efectivo para el tratamiento del dolor leve a moderado incluyendo: dolor de cabeza, migraña, dismenorrea, dolor de garganta, dolores musculares, fiebre, dolor después de una vacuna, dolores dentales y alivio del malestar de la gripe y/o resfrío.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

No exceder la dosis recomendada. En pacientes con enfermedades del riñón, corazón o pulmón y en pacientes con anemia (disminución de la tasa de hemoglobina en la sangre, a causa o no de una disminución de glóbulos rojos), consultar con el médico antes de tomar el medicamento. El consumo de bebidas alcohólicas puede provocar que el Acetaminofeno (Paracetamol) produzca daño en el hígado. Si el dolor se mantiene durante más de 3 días en niños o 5 días en adultos (2 días para el dolor de garganta) o la fiebre durante más de 3 días, o empeoran o aparecen otros síntomas, se debe interrumpir el tratamiento y consultar al médico. Evitar tratamientos prolongados.

CONTRAINDICACIONES:

Contraindicado en personas con hipersensibilidad conocida al Acetaminofeno (Paracetamol). No debe administrarse a personas que sufran de enfermedad hepática o renal graves.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Las drogas inductoras de las enzimas hepáticas como: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina pueden aumentar la hepatotoxicidad del Acetaminofeno (Paracetamol). El efecto anticoagulante de la warfarina y de otros anticoagulantes cumarínicos, puede verse aumentado por el uso diario, regular y prolongado de Acetaminofeno (Paracetamol), aumentando el riesgo de sangramiento; dosis ocasionales de Acetaminofeno (Paracetamol), no tienen efecto significativo. En caso de requerir atención médica por otras razones no olvide mencionar que está tomando este medicamento.

EFFECTOS INDESEABLES:

Napafen® 500 mg Tabletas en general es bien tolerado, alivia el dolor sin producir acidez. Sin embargo, si cualquiera de los siguientes síntomas aparece de tomar el medicamento y consulte al médico: Síntomas de alergias (ronchas, hinchazón, picazón), ojos o piel amarilla, diarrea, pérdida del apetito, náuseas, vómitos o deposiciones con sangre.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

La duración de su tratamiento con Napafen® 500 mg Tabletas se la indicará su médico. No suspenda el tratamiento antes ni de forma brusca, ya que podría ser perjudicial para la evolución de su enfermedad y volver a aparecer las molestias de antes del tratamiento.

SOBREDOSIS:

La intoxicación con Acetaminofeno (Paracetamol) es peligrosa y más en los pacientes ancianos y en los niños pequeños (sobredosis terapéutica o intoxicación accidental) en los que puede resultar mortal, por lo que se recomienda concurrir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano.

Los síntomas que se manifiestan habitualmente en las primeras 12 a 24 horas son: palidez, náuseas, vómitos, sudoración, anorexia y dolores abdominales.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños y a temperatura no mayor a 30°C.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

NAPAFEN® 500

Reg. San. 5.232-04-06-04

Caja x 5 ristas de 10 tabletas cada una + inserto

Caja x 10 ristas de 10 tabletas cada una + inserto

Caja x 6 blisters x 8 tabletas + 1 blister x 2 tabletas + inserto

Caja x 7 blisters x 8 tabletas + inserto

Caja x 5 blisters x 8 tabletas + inserto

Caja x 1 blister x 2 tabletas + inserto - muestra médica

NAPAFEN® SIN ALCOHOL

ACETAMINOFENO (PARACETAMOL) 120 ML

JARABE

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y si tiene cualquier duda con respecto a la información consulte con su médico antes de administrar el medicamento. Siga las instrucciones de uso de este producto. Si las molestias persisten por más de siete días consulte con su médico.

COMPOSICIÓN:

Cada 5 ml de Jarabe contiene: Acetaminofeno (Paracetamol) 160 mg
Excipientes: Propilenglicol, benzoato de sodio, carbowax 1450, ácido cítrico, sucralosa, FD&C Rojo # 40, Sacarina Sódica, Sorbitol, saborizante vainilla, agua purificada.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:

Analgésico - antipirético.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vía de administración: Oral.

Dosificación:

Repetir una dosis cada 4 ó 6 horas, sin exceder de 5 veces al día.

EDAD

Menos de 3 años
3 años
4-5 años
6-8 años
9-10 años
12 en adelante

DOSIS

La que señale el médico.
1 a 1 1/2 cucharadita.
1 3/4 a 2 cucharaditas.
2 1/2 a 3 cucharaditas.
3 1/2 a 4 cucharaditas.
4 cucharaditas.

Napafen® sin alcohol jarabe es efectivo para el tratamiento del dolor leve ha moderado incluyendo: dolor de cabeza, migraña, dismenorrea, dolor de garganta, dolores musculares, fiebre, dolor después de una vacuna, dolores dentales y alivio del malestar de la gripe y/o resfrío.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES:

No exceder la dosis recomendada. En pacientes con enfermedades del riñón, corazón o pulmón y en pacientes con anemia (disminución de la tasa de hemoglobina en la sangre, a causa o no de una disminución de glóbulos rojos), consultar con el médico antes de tomar el medicamento. El consumo de bebidas alcohólicas puede provocar, que el paracetamol produzca daño en el hígado. Si el dolor se mantiene durante más de 3 días en niños o 5 días en adultos (2 días para el dolor de garganta) o la fiebre durante más de 3 días, o empeoran o aparecen otros síntomas, se debe interrumpir el tratamiento.

CONTRAINDICACIONES:

Contraindicado en personas con hipersensibilidad conocida al paracetamol. No debe administrarse a personas que sufran de enfermedad hepática o renal graves.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS:

Las drogas inductoras de las enzimas hepáticas como: fenobarbital, fenitoína, carbamazepina pueden aumentar la hepatotoxicidad del paracetamol. El efecto anticoagulante de la warfarina y de otros anticoagulantes cumarínicos, puede verse aumentado por el uso diario, regular y prolongado de paracetamol, aumentando el riesgo de sangramiento; dosis ocasionales de paracetamol, no tienen efecto significativo. En caso de requerir atención médica por otras razones no olvide mencionar que está tomando este medicamento.

EFFECTOS INDESEABLES:

Napafen® sin alcohol jarabe en general es bien tolerado, alivia el dolor sin producir acidez. Sin embargo, si cualquiera de los siguientes síntomas aparece deje de tomar el medicamento y consulte al médico: Síntomas de alergias (ronchas, hinchazón, picazón), ojos o piel amarilla, diarrea, pérdida del apetito, náuseas, vómitos o deposiciones con sangre.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:

La duración de su tratamiento con Napafen® sin alcohol jarabe se la indicará su médico. No suspenda el tratamiento antes ni de forma brusca, ya que podría ser perjudicial para la evolución de su enfermedad y volver a aparecer las molestias de antes del tratamiento.

SOBREDOSIS:

La intoxicación con Acetaminofeno (Paracetamol) es peligrosa y más en los pacientes ancianos y en los niños pequeños (sobredosis terapéutica o intoxicación accidental) en los que puede resultar mortal, por lo que se recomienda concurrir de inmediato al hospital o centro de salud más cercano.

Los síntomas que se manifiestan habitualmente en las primeras 12 a 24 horas son: palidez, náuseas, vómitos, sudoración, anorexia y dolores abdominales.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños, a temperatura no mayor a 30°C.

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

Napafen® sin alcohol jarabe Frasco x 120 ml

Reg. San. 03037-MAN-03-04