

HISTACALM® LOCIÓN

Óxido de Zinc, Benzocaína

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y si tiene cualquier duda con respecto a la información consulte con su médico antes de administrar el medicamento. Siga las instrucciones de uso de este producto. Si las molestias persisten por más de siete días consulte con su médico.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA:

Antipañalitis - Anestésico Tópico - Refrescante

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:

Vía de administración: Tópica

COMPOSICIÓN: Cada 100 ml contiene: Óxido de Zinc 12,520 g, Benzocaína 0,300 g.

EXCIPIENTES: Carboximetil Celulosa Sódica, Glicerina, Propilenglicol, Glicerido, Triglicéridos de cadena media, Polisorbato 80, Metilparabeno, Propilparabeno, Etanol, Agua Purificada, Color Rojo #40 FDC CI 16035, Fragancia de rosas, Alcanfor.

INDICACIONES: Ayuda a prevenir la pañalitis y, en caso de presentarse, alivia las molestias ocasionadas por el ardor. Proporciona un alivio inmediato del ardor, dejando una agradable sensación de frescura sobre la piel seca, inflamada o con comezón. Es especialmente útil en casos de urticaria, eritema solar, irritaciones, prurito de diversas etiologías y picaduras de insectos.

MODO DE USO Y POSOLOGÍA: Limpiar y secar bien las partes afectadas y aplicar de 3 a 4 veces diarias. Por un máximo de 7 días.

ADVERTENCIAS: No utilizar en piel con fisuras, en áreas exudadas o ampolladas, ni en superficies mucosas. Evitar el contacto con los ojos. **Si los síntomas persisten consulte con su médico**

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad a cualquiera de sus componentes.

PRECAUCIÓN EN EMBARAZO Y LACTANCIA: No hay estudios que demuestren que hagan daño al feto, pero es preferible usar bajo vigilancia médica.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: No usar en menores de 2 años. Ni mayor dosis que la recomendada por su médico.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: No usar más de las dosis recomendadas, debido a la delgadez de la piel en los adultos mayores.

REACCIONES ADVERSAS: Irritación local de la piel, en cuyo caso, debe ser lavada con abundante agua.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No existe evidencia de que por la vía tópica haya absorción de sus componentes a nivel sistémico, razón por la cual no se considera la interacción con otros medicamentos.

ACCIÓN SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR: Ninguna descrita.

SOBREDOSIS: En caso de ingesta accidental induzca al vómito y dele tratamiento sintomático de soporte, y lleve al paciente a un centro de salud.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Conservar fuera del alcance de los niños, mantenerse en su envase original a temperatura no mayor a los 30° C y protegido de la luz.

VENTA LIBRE

PRESENTACIÓN COMERCIAL:

HISTACALM® LOCIÓN Reg. San. No. 02464-MAC-02-03

Frasco x 100 ml + Inserto

Frasco x 120 ml + Inserto

Frasco x 150 ml + Inserto

Elaborado por **Laboratorios Dr. A. Bjärner C. A.** - Guayaquil - Ecuador
Calicuchima 601 y Noguchi / Casilla 01-09-1292

Email: info@grupoecu.com

www.laboratoriosbjärner.com