

CLOMAZOL®
CLOTRIMAZOL

CREMA Y POLVO

FOLLETO DE INFORMACIÓN AL PACIENTE.-

Lea con atención este folleto y si tiene cualquier duda con respecto a la información consulte con su médico antes de administrar el medicamento. Siga las instrucciones de uso de este producto. Si las molestias persisten por más de siete días consulte con su médico.

CLOMAZOL® CREMA (TÓPICA)

COMPOSICIÓN: Cada 20 g de crema contiene 0,200 g de Clotrimazol
EXCIPIENTES: Propilenglicol, Propilparabeno, Lauril Sulfato de Sodio, Fosfato Dibásico de Sodio, Fosfato Monobásico de Sodio, Alcohol Cetílico, Aceite Mineral, Agua Purificada.

CLOMAZOL® POLVO (TÓPICO)

COMPOSICIÓN: Cada 100 g de polvo contiene 1,00 g de Clotrimazol.
EXCIPIENTES: Dióxido de Silicio Coloidal, Talco.

CLASIFICACIÓN TERAPÉUTICA: Antimicótico de amplio espectro
VÍAS DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIFICACIÓN:
VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Uso Tópico

INDICACIONES: Tratamiento tópico de las micosis superficiales de la piel como: Dermatomicosis, Clomazol® Crema y Polvo en pie de atleta, herpes circinado, eczema marginado de hebra, tiña de los pies y de las manos, tiña del cuerpo, tiña inguinal, tiña ungular. Micosis de la barba y otomicosis, pitiriasis versicolor y eritrasma.

DOSIFICACIÓN Y MODO DE USO: Clomazol® Crema y Polvo: Se recomienda aplicar de 2 a 3 veces al día en la zona afectada mediante fricción suave, hasta lograr la total adhesión del Clomazol.

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO: La duración del tratamiento depende de la localización y extensión del área afectada. No suspenda el tratamiento antes ni de forma brusca, ya que podría ser perjudicial para la evolución de su enfermedad y puede volver aparecer las molestias de antes del tratamiento. Se debe usar al menos una semana después de notar la curación. Luego se puede usar a diario para evitar que se vuelva a desarrollar la enfermedad.

ADVERTENCIAS: Se debe evitar el contacto con los ojos y mucosas. **Si los síntomas persisten consulte a su médico.**

CONTRAINDICACIONES: Hipersensibilidad al clotrimazol, derivados imidazólicos, o a cualquier componente de la fórmula.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS: No se conocen.

PRECAUCIONES GENERALES: Clomazol® Crema y Polvo debe evitarse el contacto con los ojos y mucosas. No se lo debe ingerir. En caso de micosis de las uñas se debe usar tratamiento sistémico.

PRECAUCIONES EN EMBARAZO Y LACTANCIA: Estudios en animales no muestran efectos dañinos directos o indirectos en relación con la toxicidad reproductiva. Como precaución, es preferible evitar el uso de clotrimazol durante el primer trimestre del embarazo. Su uso debe estar indicado por un médico. En la lactancia los datos farmacodinámicos y toxicológicos disponibles en animales han demostrado la excreción de clotrimazol y sus metabolitos en la leche. Por lo que se debe Interrumpir la lactancia durante el tratamiento con clotrimazol.

EFFECTOS INDESEABLES: En casos aislados pueden presentarse reacciones locales pasajeras, como: Irritación, sensación de quemazón, picazón, que no suelen determinar la supresión del tratamiento y son más frecuentes durante los primeros días del mismo. Si se observa cualquier otra reacción adversa, consulte a su médico.

PRECAUCIONES PEDIÁTRICAS: A menos que sea indicada por un médico no usar en menores de 2 años.

PRECAUCIONES GERIÁTRICAS: No se han encontrado datos al respecto de este grupo etario.

EFFECTOS SOBRE LA CAPACIDAD DE CONDUCIR U OPERAR MAQUINARIA: Ninguna conocida.

SOBREDOSIS: En caso de sobredosis o ingestión accidental, no es posible que exista un riesgo de intoxicación aguda, sin embargo, se recomienda consultar inmediatamente con el médico o acudir al centro de atención más cercano.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO: Todo medicamento debe conservarse fuera del alcance de los niños y a temperatura no mayor a 30° C.

VENTA LIBRE

PRESENTACIONES COMERCIALES:

CLOMAZOL® CREMA (TÓPICA) Reg. San. N° 7.283 -2-09-03
Caja x 1 Tubo x 20 g + Inserto
Caja x 1 Tubo x 8 g + Inserto (Muestra Médica)

CLOMAZOL® POLVO (TÓPICO) Reg. San. N° 04465-MAN-10-06
Caja x Frasco x 45 g + Inserto
Caja x Frasco x 90 g + Inserto
Caja x Frasco x 20 g + Inserto (Muestra Médica)